

کانی ویت B

مکمل درمانی ویتامین B_{complex}

هر کیلوگرم کانی ویت B حاوی :

| | | | | |
|----------|-------|----------------------------|----------------|--------------|
| میلی گرم | ۱۵۰۰ | (Thiamine mononitrate) | B1 | ویتامین |
| میلی گرم | ۴۰۰۰ | (Riboflavin) | B2 | ویتامین |
| میلی گرم | ۱۰۰۰۰ | (Pantothenic acid) | B3 | ویتامین |
| میلی گرم | ۲۰۰۰۰ | (Nicotinic acid) | B5 | ویتامین |
| میلی گرم | ۲۰۰۰ | (Pyridoxine hydrochloride) | B6 | ویتامین |
| میلی گرم | ۵۰۰ | (Folic acid) | B9 | ویتامین |
| میلی گرم | ۲۰ | (Cyanocobalamin) | B12 | ویتامین |
| میلی گرم | ۷۰ | (Biotin) | H ₂ | ویتامین |
| گرم | ۱۵۰ | | | کولین کلراید |
| گرم | ۱۰۰۰ | | | کاربرتا |

عوارض کمبود :

در طیور کمبود ویتامین‌های گروه B موجب کاهش رشد ، پروزیس ، عوارض پوستی ، ضعف در پر درآوری ، کم خونی ، بیماری‌های کبد چرب و کتوز ، کاهش تخم مرغ ، کاهش جوجه درآوری و بیماری ستاره‌نگری می‌گردد . کمبود ویتامین‌های گروه B در گوساله و برده موجب نکروز بخش قشری مغز ، اختلال در حرکت ، اختلال در دید و حتی کوری ، ژولیدگی پوشش خارجی و کاهش رشد می‌گردد .

● از آنجایی که میکروفلور شکمبه نشخوارکنندگان بیشتر ویتامین‌های محلول در آب را می‌سازد ، معمولاً کمبود این ویتامین‌ها در گاو سالم که شکمبه آن فعال است دیده نمی‌شود .

مقدار مصرف :

پیشگیری : یک کیلوگرم کانی ویت B در یک تن خوراک

درمان : برحسب شدت علایم کمبود ، طبق دستور دکتر دامپزشک مقدار مصرف تا دو کیلوگرم در تن

شماره پروانه ساخت 87-510-V.F.G از سازمان دامپزشکی کشور